

Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Kreditovaný autodidaktický test: gastrointestinální onkologie

1. Jaká je minimální doporučená hodnota detekce adenomových polypů (ADR) v rámci screeningových center:

- a) 20 %
- b) 25 %
- c) 30 %
- d) 15 %

2. Která z uvedených diagnostických vyšetření je spojena s vyšší detekcí adenomových polypů (ADR):

- a) screeningová koloskopie
- b) TOKS-pozitivní koloskopie
- c) CT kolografie
- d) sigmoidoskopie

3. Který typ antikoagulace je považován za bezpečný v případě endoskopického odstranění diminutivního polypu:

- a) dabigatran
- b) rivaroxaban
- c) warfarin
- d) apixaban

4. Co je považováno za absolutní kontraindikaci chirurgické resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu:

- a) extrahepatální metastázy
- b) stenozující primární tumor

- c) dlouhotrvající terapeutická odpověď na systémovou léčbu
- d) nedostatečný zbytkový objem jaterní tkáně

5. Který symptom je pozorován nejčastěji při akutní nekróze jícnu (tzv. černého jícnu):

- a) hemateméza
- b) bolest břicha
- c) meléna
- d) dysfagie

6. U 96 pacientů po transplantaci pečene, které rizikové faktory (okrem CKD) zistené jeden rok po transplantácii signifikantne predpovedali CKD (chronickú chorobu obličiek) po 5 rokoch sledovania:

- a) hypertenzia, BMI
- b) HDL, glykémia, HOMA
- c) steatóza pečene
- d) fibróza pečene

7. U 96 pacientů po transplantaci pečene, ktoré rizikové faktory zistené jeden rok po transplantácii signifikantne predpovedali úmrtie na konci sledovania s mediánom 64,9 mesiacov:

- a) diabetes, hypertenzia, HDL cholesterol
- b) steatóza pečene

- c) ALT, ALP, everolimus v liečbe
- d) NAS skóre, tacrolimus v liečbe

8. Aký charakter endosonografického obrazu mali zobrazené pankreatické neuroendokrinné nádory v súbore 25 pacientov:

- a) 50 % hypoechogénne, 50 % hyperechogénne
- b) 100 % hypoechogénne
- c) 100 % hyperechogénne
- d) 68 % hypoechogénne, 12 % hyperechogénne

9. Ktorý test sa v súčasnosti považuje za zlatý štandard pre diagnostiku malabsorpcie žlčových kyselín:

- a) ⁷⁵Selenium HomoCholic Acid Taurine Test (SeHCAT)
- b) vyšetrenie sérovej koncentrácie FGF19
- c) vyšetrenie stolice na odpad žlčových kyselín/24 hod
- d) vyšetrenie sérovej koncentrácie žlčových kyselín

10. Pri podozrení na diagnózu autoimunitnej pankreatitídy, medzi jej hlavné diagnostické kritériá patri:

- a) zvýšená sérová koncentrácia IgG4
- b) prítomnosť diabetes mellitus
- c) prítomnosť iných autoimunitných chorôb
- d) vylúčenie malígneho nádoru pankreasu