

Poděkování recenzentům

Thanks to reviewers

Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie děkuje všem laskavým recenzentům, kteří v průběhu roku 2022 posuzovali práce doručené do redakce. Velmi si vážíme nezištné pomoci a času, který jste věnovali hodnocení příspěvků a snaze zvýšit odbornou kvalitu našeho časopisu. Pevně věříme, že budeme moci využívat Vašich odborných vědomostí a zkušeností při přípravě publikací i v dalším období.

Seznam recenzentů, kteří aktivně spolupracovali s časopisem Gastroenterologie a hepatologie v roce 2022:

Balihar Karel	Dvořák Karel	Hucl Tomáš	Kubičková Kristýna	Teplan Vladimír
Bánovčin Peter	Jarčuška Peter	Kaščák Marian	Mačinga Peter	Trojánek Milan
Bátovský Marian	Falt Přemysl	Kohout Pavel	Mareš Karel	Vítek Petr
Bortlík Martin	Fraňková Soňa	Koječký Vladimír	Mikoviny Kajzrlíková Ivana	Wohl Pavel
Brůha Radan	Holéczy Pavol	Kolář Martin	Novotný Aleš	Zárubová Kristýna
Bunganič Bohuš	Hejda Václav	Koller Tomáš	Peterka Štěpán	
Cyrany Jiří	Horný Ivo	Koželuhová Jana	Skladaný Lubomír	
Douda Tomáš	Hrdlička Luděk	Kroupa Radek	Suchánek Štěpán	

SAVE THE DATE

08. - 09. SEPTEMBER 2023

XXXVI. HILDEBRANDOVE BARDEJOVSKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNI

TÉMA: PORUCHY MOTILITY HORNÉHO A DOLNÉHO GITU

SGS SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

PROLOMÍ KAŽDOU ZÁCPU



TITANLAX™

- K léčbě zácpy a plynatosti
- Unikátní kombinace makrogolu, psyllia a simetikonu

BAUSCH Health

TITANLAX™ zdravotnický prostředek. Název a složení: TITANLAX sáčky. Jeden sáček obsahuje: makrogol 3350, Psyllium, simetikon. **Použití:** Přípravek se užívá k léčbě chronické nebo akutní zácpy nebo zácpy související se syndromem dráždivého tračníku (IBS - Irritable Bowel Syndrome) a při nadměrné produkci gastrointestinálního plynu. **Dávkování:** Děti od 6 do 12 let: 1 sáček denně; Dospělí a děti nad 12 let: 2 sáčky denně; Použití u dětí je vhodné konzultovat s lékařem. Obsah sáčku je potřeba dobře rozpustit ve sklenici vody a ihned vypít. Vzhledem ke gelotvorné aktivitě Psyllia se doporučuje přípravek užívat mezi jídly a zapít dostatečným množstvím vody. Přípravek není určen pro děti do 6 let. Použití u dětí je vhodné konzultovat s lékařem. **Kontraindikace:** Střevní obstrukce nebo stenóza; perforace střev; zánětlivé onemocnění střev (například Crohnova choroba, ulcerózní kolitida). Užívání u těhotných a kojících je nutno konzultovat s lékařem. **Interakce:** Při současném užití přípravku TITANLAX může být ovlivněna biologická dostupnost jiných přípravků. Účinnost může nepříznivě ovlivnit osmotická síla makrogolu. Psyllium může zvýšit účinek antidiabetik, což může způsobit zvýšenou hypoglykemii. Je doporučeno užívat jiné přípravky minimálně 2 hodiny po nebo před TITANLAXEM. **Nežádoucí účinky:** gastrointestinální poruchy (průjem, bolesti břicha, kručení v břiše a nevolnost), vzácně – alergická reakce (vyrážka a kopřivka) na kteroukoliv složku tohoto přípravku. **Podmínky uchování:** Uchovávat na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a světla, při teplotě do 25 °C. **Balení:** 20 sáčků po 9,15 g. **Revize:** 12.2021. **Výrobce:** SIIT srl, Via Ariosto 50/60, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Itálie. URČENO PRO ODBORNOU VĚŘEJNOST. PharmaSwiss ČR, s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7.