

Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Kreditovaný autodidaktický test: IBD

1. Pro tzv. neurogenní střevo je charakteristické:

- a) průjem a inkontinence
- b) zácpa a inkontinence
- c) samotná inkontinence
- d) zvracení a paralytický ileus

2. U pacientek s IBD je léčba vedolizumabem v graviditě:

- a) nevhodná, není však kontraindikovaná
- b) kontraindikovaná po celou dobu těhotenství
- c) kontraindikovaná ve třetím trimestru
- d) bezpečná pro matku i plod

3. Biosimilární biologika lze u pacientů s IBD vzájemně zaměnit:

- a) pokud jde o první linii léčby
- b) kdykoliv se souhlasem pacienta
- c) pouze v prvním roce léčby
- d) kdykoliv i bez souhlasu pacienta

4. Adenokarcinom tlustého střeva z prstenčitých buněk je:

- a) vzácným typem nádoru v běžné populaci u pacientů s IBD
- b) relativně častou komplikací ulcerózní kolitidy
- c) častým typem kolorektálního karcinomu
- d) běžným typem nádoru u pacientů s Crohnovou chorobou rektu

5. Koncentrace vedolizumabu v pupečnickové krvi novorozence exponovaného tomuto léku v graviditě jsou obvykle:

- a) až pětinasobné ve srovnání s koncentrací v krvi matky
- b) vždy stejné jako koncentrace v krvi matky
- c) nižší než koncentrace v krvi matky v době porodu
- d) nedetekovatelné, protože vedolizumab neprochází placentou

6. Které tvrzení o biosimilárních léčících je pravdivé:

- a) biosimilární biologika jsou více imunogenní a vyvolávají častěji alergické reakce ve srovnání s originálními léky
- b) jejich klinická účinnost a bezpečnost se neliší od originálního léku
- c) jejich podávání v dětské populaci je zakázáno
- d) mohou být podávány pouze současně s azathioprinem

7. Při poranění páteře dochází k rozvoji horních symptomů (zpomalení pasáže jícnem a žaludkem, event. i porucha polykání) při lokalizaci míšní léze nad:

- a) Th3
- b) Th5
- c) L1
- d) Th1

8. Lékem první volby v terapii komplexních perianálních píštělí u pacientů s Crohnovou chorobou je:

- a) infliximab
- b) vedolizumab
- c) tofacitinib
- d) azathioprin

9. Změna fenotypu IBD z UC na CD je u pacientů po proktokolektomii s IPAA:

- a) naprosto výjimečná
- b) častá, dochází k ní u více než poloviny pacientů
- c) relativně častá, postihuje až 20 % pacientů
- d) vždy známkou chybně stanovené původní diagnózy UC

10. Kortikodependence u pacientů s IBD je definována jako:

- a) stav, kdy dávku prednisonu nelze snížit pod 5 mg/d během 3 týdnů od zahájení léčby
- b) stav, kdy dojde k relapsu UC do 3 roků od ukončení léčby systémovými kortikoidy
- c) stav, kdy musí být pacient léčen systémovými kortikoidy alespoň 3 měsíce v roce
- d) stav, kdy dávku prednisonu nelze snížit pod 10 mg/d během 3 měsíců od zahájení léčby, nebo dojde k relapsu UC do 3 měsíců od ukončení léčby systémovými kortikoidy